

Disperss 80wdg

Fungicida

Gránulos dispersables en agua

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL:

	Porcentaje en peso
Ingrediente activo:	
Azufre elemental (Equivalente a 800 g por kg)	
No menos de:.....	80.0%
Ingredientes inertes:	
Agente antiespumante	
No más de:.....	0.05%
Dispersante	
No más de:.....	18.20%
Portador agua	
No más de:.....	1.75%
Total:	100.0%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.

DISPERSS 80WDG es un producto ligeramente tóxico, por lo que no se debe comer, beber o fumar durante su manejo.

Utilice ropa protectora, overol, pantalón largo, camisa de manga larga, calcetines y zapatos, guantes, mascarilla y botas de hule para la mezcla y aplicación del producto. Evite el contacto directo con el producto.

Evite respirar el polvo o la neblina de aspersión.

Báñese con suficiente agua después de cada jornada de trabajo y póngase ropa limpia.

No lave la ropa de trabajo y el equipo de protección junto con la ropa normal.

Advertencia sobre riesgos: DISPERSS 80WDG es un producto ligeramente tóxico, evite el contacto directo con el producto, no coma, no beba o fume durante su manipulación.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas habitación.

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años.

No se reutilice el envase, destrúyase.

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

DISPERSS 80WDG es un fungicida de contacto, con acción protectante a base de azufre para el control de enfermedades en los siguientes cultivos.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Para la aplicación de DISPERSS 80WDG es factible utilizar equipos convencionales de aplicación, vierta el producto lentamente en la cantidad de agua necesaria, agitando enérgicamente.

Mantenga agitación constante. Todas las partículas de DISPERSS 80WDG permanecerán en completa suspensión y sin formar aglomerados.

CONTRAINDICACIONES: El azufre puede causar quemaduras en el follaje cuando se presentan altas temperaturas, superiores a los 30°C, por lo que es recomendable usar las dosis más bajas o evitar su uso. Al aplicarlo de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no causa daños a los cultivos.

INCOMPATIBILIDAD: DISPERSS 80WDG no debe mezclarse con aceites o líquidos emulsificables.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión:

En caso de ingestión, induzca el vómito.

Inhalación:

Retire a la persona del área afectada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial.

Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua por espacio de 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte al médico.

Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y lave las zonas afectadas con suficiente agua y jabón.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

Síntomas: Irritación y molestias en la piel o comezón. Lagrimeo de ojos, molestias y vista borrosa.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine fuentes de agua, arroyos, ríos o lagunas.

No reutilice las aguas de lavado del equipo, viértalas en el campo de aplicación. Este producto no es tóxico para peces ni para las abejas. No aplique en horas de mucho viento cerca de plantaciones susceptibles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicamentos, ropa o forrajes. Almacene bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases vacíos. Este producto produce vapores inflamables, evite poner el producto en contacto con fuentes de calor excesivo y de alta humedad.

GARANTIA: Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, el formulador o sus distribuidores, o ambos, no se hacen responsables del resultado o usos de este producto. El formulador sólo responde de la formulación correcta y del contenido neto.

USESE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivos	Plagas		Dosis (kg/100 L de agua)	Intervalo de seguridad	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Aguacatero	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Almendro	Pudrición del fruto Cenicilla	<i>Monilinia spp</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Avena Cebada Centeno Trigo	Cenicilla	<i>Erysiphe graminis</i>	4-6 kg/ha	Sin límite	Exento
Berenjena	Mancha foliar	<i>Septoria sp</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Brócoli Col Col de Bruselas Coliflor	Cenicilla	<i>Erysiphe sp</i>	0.2-0.4		
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía	Cenicilla	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Chícharo	Cenicilla Mancha foliar	<i>Erysiphe polygoni</i> <i>Cercospora sp</i>	0.2-0.5	Sin límite	Exento
Cacahuete	Mancha café de la hoja Cenicilla	<i>Cercospora arachidicola</i> <i>Erysiphe polygoni</i>	1.5-3.0	Sin límite	Exento
Ciruelo	Cenicilla Roña	<i>Sphaerotheca spp</i> <i>Venturia cerasi</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Chabacano	Cenicilla	<i>Podosphaera oxycanthae</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Durazno	Pudrición morena Cenicilla Verrucosis	<i>Molinilia fruticola</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Taphrina deformans</i>			Exento
Fresa	Cenicilla	<i>Sphaerotheca macularis</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Frijol Garbanzo Soya	Cenicilla	<i>Erysiphe polygoni</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Grosella	Cenicilla	<i>Sphaerotheca sp</i>	0.2-0.5	Sin límite	Exento
Hule	Cenicilla de hule	<i>Oidium heveae</i>	0.1-0.2	Sin límite	Exento
Jitomate Papa	Cenicilla Mancha foliar	<i>Leveillula sp</i> <i>Septoria lycopersici</i>	0.2-0.5	Sin límite	Exento
Lima Limonero Mandarino Naranja Tangerino Toronjo	Antracnosis Cenicilla Fumagina Melanosis Roña	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> <i>Oidium tingitaninum</i> <i>Capnodium citri</i> <i>Diaporthe citri</i> <i>Elsinoe fawcettii</i>	0.4-0.7	Sin límite	Exento
Maíz	Diente de caballo	<i>Claviceps gigantea</i>	0.2-0.3	Sin límite	Exento
Mango	Antracnosis Cenicilla	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> <i>Oidium magniferae</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento

Manzano	Cenicilla Sarna o roña	<i>Podosphaera leucotricha</i> <i>Venturia inaequalis</i>	0.2-0.7	Sin límite	Exento
Peral	Roña	<i>Venturia pirina</i>	0.2-0.7	Sin límite	Exento
Papayo	Cenicilla	<i>Asperisporium caricae</i>	0.2-0.4	Sin límite	Exento
Ornamentales	Cenicilla	<i>Oidium sp</i>	0.2	Sin límite	Exento
Rosal	Cenicilla Roya	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Phragmidium rosae</i>	0.25	Sin límite	Exento
Vid	Cenicilla	<i>Uncinula necator</i>	0.2-0.3	Sin límite	Exento

OBSERVACIONES: Repita las aplicaciones cada 7-14 días, dependiendo de la incidencia de la enfermedad.

El periodo de espera entre la última aplicación y la cosecha es de 7 días. Reingrese al campo tratado 24 horas después de la aplicación.